









Gebärmutter-Hals-Krebs-Früherkennung
Die Bedeutung der Beurteilung der Abstriche: II. (sicher bösartig)

PAP-Gruppe		Klassifikationskriterien	Empfehlung
IIID		Nachweis gering- bis mäßiggradige Dysplasiezellen, ggf. mit HPV-Zeichen.	Dreimonatige Kontrollintervalle unter Einschluss einer Kolposkopie und ggf. auch einer HPV-Analyse; bei über einjähriger Laufzeit ggf. histologische Abklärung (Konisation, Abrasio, Probeexzision).
		CIN I  CINII	
IVa		Nachweis von schweren Dysplasien bzw. Carcinoma in situ.	Histologische Abklärung (Konisation, Abrasio, Probeexzision); unter besonderen Umständen wie in der Schwangerschaft, post partum oder bei starker Entzündung ggf. einmonatige Kontrollintervalle unter Einschluss einer Kolposkopie und ggf. einer HPV-Analyse.
	CIN III und CIS 	Konus 	
IVb		Nachweis von mindestens Carcinoma in situ. Ein invasives Karzinom ist Nicht ausgeschlossen.	Histologische Abklärung (Konisation, Abrasio, Probeexzision) nach Kolposkopie und ggf. HPV-Analyse.
V		Nachweis von Zellen eines invasiven Tumors Invasives Karzinom 	Histologische Abklärung (Konisation, Abrasio, Probeexzision) nach Kolposkopie und ggf. HPV-Analyse; ggf. Laparoskopie oder onkologische Hysterektomie
HPV	Koilozyten 	Kolposkopie 	 Auf wiederschauen!

Praxis für Pathologie, Dr. med. Simon Savin, Ebertstr. 11, 76135 Karlsruhe, Tel. 0721/3548440
Poststr. 6, 77652 Offenburg, Tel. 0781/30868
WWW.pathologie-savin.de

Haben Sie noch Fragen?